

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription  
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



DLF 21 - 3 - 05488406

## Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 52

du 15 Mars 1985

- Détruisez la flavescente dorée dans l'oeuf
- Fraisiers : la floraison commence.
- Jeunes cochenilles ? fumagine ? c'est le moment de traiter les oliviers.

### VIGNE :


#### FLAVESCENCE DORÉE

Elle sévit toujours en Marana, Casinca et sur Patrimonio, des foyers ont été identifiés en 1984 dans la région d'Ajaccio et le Sartenaïs. Quelques ceps touchés ont été observés sur Linguizetta, Aléria, Ghisonaccia.

Cépages les plus sensibles par ordre décroissant :

Niellucio, Malvoisie, Alicante, Carignan, Cinsault, Ugni'Blanc, Cabernet.

Une cicadelle (différente de la cicadelle verte commune) *Scaphoïdeus Littoralis* transmet la maladie d'un cep à l'autre en piquant les feuilles.



Oeuf de *Scaphoïdeus Littoralis*  
1 à 1,5 mm de long, 0,30 mm de large

En hiver, on peut diminuer la population de cicadelles en détruisant les oeufs; Bien à l'abri sous les écorces ceux-ci sont difficilement atteints par les traitements.



**B**

#### Bourgeon dans le coton

Suit de près le début des « pleurs ». Bourgeon gonflé dont les écailles s'écartent, protection cotonneuse brunâtre très visible.

Les Niellucio arrivant progressivement au stade B, le traitement doit être réalisé dans tous les secteurs durant la semaine du 18 au 23 Mars.

Il faut bien mouiller les ceps jusqu'au sol et employer une bouillie contenant de l'Oléoparathion (45 g/hl)

## FRAISIERS :

Certaines variétés sont déjà au stade pleine floraison. Un traitement anti-botrytis devra être réalisé avec les produits suivants :

Iprodione  
Vinchlozoline  
Procymidone  
Dichlofluanide

ROVRAL  
RONILAN  
SUMISCLEX  
EUPARENE



Sous les feuilles, on peut observer des formes hivernantes d'acariens. Intervenir avec un acaricide non dangereux pour les abeilles.

Bromopropylate  
Cyhexatin  
Dicofol

NEORON  
PLICTRAN - MITACID  
KELTHANE

## ABRICOTIERS :

### Monilia :

Le 2e traitement est encore possible pour les variétés tardives.

## OLIVIERIERS :

Cochenilles, fumagine, cycloconum.

### **cochenille**



Après la taille intervenez avec une bouillie contenant :

- 40 g/hl de methidathion (Ultracide)
- 250 g de Cuivre métal /hl
- 2 litres d'huile d'été (seppic été) facultatif.

la pulvérisation sera abondante pour bien lessiver les feuilles



Une méthode de lutte biologique est également possible en utilisant des petits insectes : *Métaphycus* qui parasitent les cochenilles;

Les essais de la Protection des Végétaux en CORSE ont donné d'excellents résultats. Les lachers de ces *Métaphycus* s'effectuent au printemps ou en automne.

-----

(C) : SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1985 - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.